

ノロウイルス食中毒！スクリーニング検査で万全の対策を！！

【ノロウイルス】


- ・感染力が強く少量でも感染
- ・潜伏期間：24～48時間（1～2日）
- ・主症状：吐き気、嘔吐、下痢等（腹痛、頭痛、発熱等を伴うこともある）
ウイルスは長く排出されるので二次感染に注意
- ・感染経路：二枚貝の生食等、感染者の糞便、嘔吐物等により感染
特に無症状病原体保有者（健康保菌者）による感染に注意
- ・予防方法：十分な加熱、手洗いの徹底、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒



図1. ノロウイルスの電子顕微鏡像
(埼玉県衛生研究所篠原先生撮影)

食品を取り扱う職場等では、症状の有無に関わらず入念な手洗いや施設の衛生管理が求められます！

【感染症状がなくても糞便中にはウイルス粒子を排出します！！】



【ノロウイルス検査案内(検便)】

検査方法	リアルタイム RT-PCR法
検査納期	1～2営業日(検体受付後) [*]
追加対応	ウイルス量のコピー数を記号表記ご希望の場合、もしくは、G I G II の型別報告をご希望の場合はご相談ください(別途料金)。
保存・運搬	冷凍または冷蔵
検査料金	下記までお問い合わせください。

(※検査のご依頼が非常に多くなる12月～2月の間は、追加で1日お時間をいただく場合があります。)

株式会社日本食品エコロジー研究所

担当部署直通

TEL. (078)321 - 2311 FAX. (078) 321 - 3066

〒651-0082 神戸市中央区小野浜町1番9号

E-mail: info@jife.co.jp

URL: http://jife.co.jp

ホームページからのお問い合わせも受け付けております。



できていますか？

衛生的な手洗い




1 流水で手を洗う




2 洗浄剤を手取る



3 手のひら、指の腹面を洗う



4 手の甲、指の背を洗う



5 指の間(側面)、股(付け根)を洗う



6 親指と親指の付け根のふくらんだ部分を洗う



7 指先を洗う



8 手首を洗う(内側・側面・外側)



9 洗浄剤を十分な流水でよく洗い流す



10 手をふき乾燥させる



11 アルコールによる消毒

2度洗いが効果的です!

2~9までの手順をくり返し2度洗いで菌やウイルスを洗い流しましょう。